PREENCHA DE FORMA BEM LEGÍVEL

Nome: _____

Número de caderno:

Grelha de Respostas

	A	B	C	D
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Atenção

Os primeiros 5 grupos desta prova são de escolha múltipla. Em cada um destes 5 grupos apenas uma das afirmações é falsa. Determine-a e assinale-a com um X na grelha de respostas. A grelha de respostas da escolha múltipla será recolhida ao fim de uma hora e trinta minutos de prova.

- Cotação: A cotação total desta prova é de 20 valores. Para cada um dos grupos de escolha múltipla a cotação atribuída é a seguinte:

- Se não responder ou assinalar com um X mais do que uma opção: 0 valores;
- Se responder correctamente: +1,5 valores;
- Se responder erradamente: -0,5 valores.

A classificação da parte de escolha múltipla (Grupos 1 a 5) é dada por $\max\{0, M\}$, onde M designa a soma das classificações obtidas nos 5 grupos de escolha múltipla.

- Duração do Exame: 2 horas e 30 minutos (+ 30 minutos de tolerância).

1. Considere as bases $\mathcal{B}_1 = ((1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1))$ e $\mathcal{B}_2 = ((1, 1, 1), (0, 1, 1), (0, 0, 1))$ do espaço vectorial $\mathbb{R}^3$. Seja $g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ a aplicação linear tal que

$$\mathcal{M}(g; \mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Apenas uma das seguintes afirmações é **FALSA**. Indique qual é.

A $\mathcal{M}(g; \mathcal{B}_2, \mathcal{B}_1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$

B $g(1, 1, 1) = (1, 2, 3).$

C $g(0, 1, 1) = (0, 1, 2).$

D g não é injectiva.

Continua no verso desta folha

2. Sejam $Q, R \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$.

Apenas uma das seguintes afirmações é **FALSA**. Indique qual é.

- A QR é invertível se, e só se, Q e R são ambas matrizes invertíveis.
- B Se $|P| = 2$ então P é invertível e $|P^{-1}| = |P|$.
- C Se $QR = RQ$ então $(Q - R)(Q + R) = Q^2 - R^2$.
- D $|QR| = |Q||R| = |R||Q| = |RQ|$.

3. Seja $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ uma aplicação linear.

Apenas uma das seguintes afirmações é **FALSA**. Indique qual é.

- A $\text{Im } f = \langle f(1, 0), f(0, 1) \rangle$.
- B f não é sobrejectiva.
- C Se f é injectiva então a sequência de vectores $(f(1, 0), f(0, 1))$ é linearmente dependente.
- D Para qualquer $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tem-se $f(a, b) = af(1, 0) + bf(0, 1)$.

4. Seja $P \in \mathcal{M}_{7 \times 7}(\mathbb{R})$ uma matriz invertível.

Apenas uma das seguintes afirmações é **FALSA**. Indique qual é.

- A P tem característica 7.
- B I_7 é a forma de escada reduzida de P .
- C P pode escrever-se como produto de matrizes elementares.
- D $|-P| = |P|$.

5. Seja $Q \in \mathcal{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ e considere as matrizes definidas da seguinte forma:

- Q_1 é a matriz que se obtém de Q multiplicando a linha 1 por -3 ;
- Q_2 é a matriz que se obtém de Q_1 adicionando à linha 1 a linha 2 multiplicada por 4;
- Q_3 é a matriz que se obtém de Q_2 trocando as linhas 1 e 2.

Em esquema, temos

$$Q \xrightarrow{-3l_1} Q_1 \xrightarrow{l_1+4l_2} Q_2 \xrightarrow{l_1 \leftrightarrow l_2} Q_3.$$

Apenas uma das seguintes afirmações é **FALSA**. Indique qual é.

- A Se $|Q| = 6$ então $|Q_3| = 2$.
- B Se $Q_3 = I_2$ então Q é invertível e $Q^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.
- C Se $Q_3 = I_2$ então $Q = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.
- D $Q_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} Q$.

Só serão consideradas as respostas devidamente justificadas. Na resolução, mude de folha sempre que mudar de grupo.

[Cotação]

6. Considere a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 5 \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_{3 \times 3}(\mathbb{R}).$$

- [1.5] (a) Calcule, utilizando o Teorema de Laplace, o determinante de A . Justifique que A é invertível.
[2.0] (b) Determine A^{-1} .

Mude de Folha

7. Considere a aplicação linear $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que

$$f(a, b, c) = (a + b + c, a + 2b + 3c),$$

para qualquer $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$.

- [1.5] (a) Determine uma base do núcleo de f . Indique, justificando, se f é injectiva.
[1.0] (b) Determine uma base da imagem de f .
[1.0] (c) Considere as bases $\mathcal{B}_1 = ((1, 1, 1), (0, 1, 1), (0, 0, 1))$ e $\mathcal{B}_2 = ((1, 1), (1, 0))$ de $\mathbb{R}^3$ e $\mathbb{R}^2$, respectivamente. Determine a matriz $\mathcal{M}(f; \mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2)$.

Mude de Folha

8. Considere a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_{3 \times 3}(\mathbb{R}).$$

- [1.0] (a) Determine os valores próprios de A e indique as respectivas multiplicidades algébricas.
[1.5] (b) Determine uma base de cada um dos subespaços próprios de A . Indique a multiplicidade geométrica de cada valor próprio.
[1.0] (c) Indique, justificando, se A é diagonalizável.

Mude de Folha

- [2.0] 9. Sejam α e β , $\alpha \neq \beta$, valores próprios de uma matriz simétrica $A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$. Sabendo que X e Y são vectores próprios de A associados, respectivamente, aos valores próprios α e β , prove que

$$X^\top Y = 0.$$

Fim

1. D

2. B

3. C

4. D

5. A

6. (a) Aplicando o Teorema de Laplace para o cálculo do determinante, por exemplo, à linha 3 de A , tem-se

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 5 \end{vmatrix} \stackrel{\text{Lapl.}}{=} 2 \times (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 5 \times (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 2 \times (-1 \times 1 - 1 \times 1) + 5 \times (1 \times 1 - (-1) \times 0) = -4 + 5 = 1. \end{aligned}$$

Como $|A| = 1 \neq 0$ concluímos que A é invertível.

(b) Como A é invertível, tem-se

$$\begin{aligned} A^{-1} &= \frac{1}{|A|} \text{adj } A = \frac{1}{1} \begin{bmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} \\ - \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} \\ + \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \end{bmatrix}^T = \frac{1}{1} \begin{bmatrix} 5 & 2 & -2 \\ 5 & 3 & -2 \\ -2 & -1 & 1 \end{bmatrix}^T \\ &= \begin{bmatrix} 5 & 5 & -2 \\ 2 & 3 & -1 \\ -2 & -2 & 1 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

■ Alternativamente, podíamos determinar A^{-1} fazendo $[A \mid I_3] \xrightarrow{(\text{linhas})} [I_3 \mid A^{-1}]$.

$$\begin{aligned} [A \mid I_3] &= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 5 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{l_3 + (-2)l_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 3 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \\ \xrightarrow{l_3 + (-2)l_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -2 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{l_2 + (-1)l_3 \\ l_1 + (-1)l_3}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 3 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -2 & 1 \end{array} \right] \rightarrow \\ \xrightarrow{l_1 + l_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 5 & 5 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -2 & 1 \end{array} \right] = [I_3 \mid A^{-1}]. \end{aligned}$$

Logo

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 5 & 5 & -2 \\ 2 & 3 & -1 \\ -2 & -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

■

7. (a) Tem-se que

$$\begin{aligned} \text{Nuc } f &= \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 : f(a, b, c) = (0, 0)\} \\ &= \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 : (a + b + c, a + 2b + 3c) = (0, 0)\} \\ &= \left\{ (a, b, c) \in \mathbb{R}^3 : \underbrace{a + b + c = 0 \wedge a + 2b + 3c = 0}_{\text{Sistema } AX = 0, \text{ nas incógnitas } a, b, c, \text{ a resolver.}} \right\}. \end{aligned}$$

Cálculo auxiliar:

$$[A|0] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{l_2 + (-1)l_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{l_1 + (-1)l_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \quad (\text{f.e.r.})$$

Então,

$$\begin{aligned} \text{Nuc } f &= \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 : a = c \wedge b = -2c\} \\ &= \{(c, -2c, c) : c \in \mathbb{R}\} \\ &= \{c(1, -2, 1) : c \in \mathbb{R}\} \\ &= \langle (1, -2, 1) \rangle. \end{aligned}$$

A sequência $((1, -2, 1))$ é uma base de $\text{Nuc } f$ porque gera $\text{Nuc } f$ e é linearmente independente (basta notar que $(1, -2, 1) \neq (0, 0, 0)$).

Como uma aplicação linear é injectiva se, e só se, o seu núcleo é constituído apenas pelo vector nulo, concluímos que f não é injectiva.

- (b) Dado que $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, pelo Teorema da Dimensão, sabemos que $\dim \mathbb{R}^3 = \dim \text{Nuc } f + \dim \text{Im } f$. Como $\dim \mathbb{R}^3 = 3$ e, pela alínea anterior, $\dim \text{Nuc } f = 1$ concluímos que $\dim \text{Im } f = 2 = \dim \mathbb{R}^2$. Como $\text{Im } f \subseteq \mathbb{R}^2$ e $\dim \text{Im } f = \dim \mathbb{R}^2$ vem que $\text{Im } f = \mathbb{R}^2$. Assim, qualquer base de $\mathbb{R}^2$ é base de $\text{Im } f$. Temos, por exemplo, a base canónica de $\mathbb{R}^2$, $((1, 0), (0, 1))$.

■ Alternativamente:

Por definição, temos que

$$\begin{aligned} \text{Im } f &= \{f(a, b, c) : a, b, c \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(a + b + c, a + 2b + 3c) : a, b, c \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(a, a) + (b, 2b) + (c, 3c) : a, b, c \in \mathbb{R}\} \\ &= \{a(1, 1) + b(1, 2) + c(1, 3) : a, b, c \in \mathbb{R}\} \\ &= \langle (1, 1), (1, 2), (1, 3) \rangle. \end{aligned}$$

A sequência $((1, 1), (1, 2), (1, 3))$ gera $\text{Im } f$ mas não é linearmente independente. Como

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & \\ 1 & 2 & \\ 1 & 3 & \end{array} \right] \xrightarrow{l_2 + (-1)l_1, l_3 + (-1)l_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & \\ 0 & 1 & \\ 0 & 2 & \end{array} \right] \xrightarrow{l_3 + (-2)l_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & \\ 0 & 1 & \\ 0 & 0 & \end{array} \right] \quad (\text{f.e.})$$

concluimos que a sequência $((1, 1), (0, 1))$ é uma base de $\text{Im } f$ pois também gera $\text{Im } f$ e é linearmente independente.

■

- (c) Como

$$\begin{aligned} f(1, 1, 1) &= (3, 6) = \mathbf{6}(1, 1) + (-\mathbf{3})(1, 0) \\ f(0, 1, 1) &= (2, 5) = \mathbf{5}(1, 1) + (-\mathbf{3})(1, 0), \\ f(0, 0, 1) &= (1, 3) = \mathbf{3}(1, 1) + (-\mathbf{2})(1, 0) \end{aligned}$$

de acordo com a definição de $\mathcal{M}(f; \mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2)$, temos $\mathcal{M}(f; \mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2) = \begin{bmatrix} 6 & 5 & 3 \\ -3 & -3 & -2 \end{bmatrix}$.

8. (a) O polinómio característico de A é

$$\begin{aligned} |A - xI_3| &= \begin{vmatrix} 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 \\ 0 & 0 & -x \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{Lapl.}]{l_3} -x(-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1-x & 1 \\ 1 & 1-x \end{vmatrix} \\ &= -x[(1-x)^2 - 1^2] = -x(1-x-1)(1-x+1) = x^2(2-x). \end{aligned}$$

Os valores próprios de A , sendo os zeros reais do polinómio característico, são: 0 e 2, com $\text{ma}(0) = 2$ e $\text{ma}(2) = 1$.

(b) Se α é um valor próprio de A sabemos que o subespaço próprio de A associado ao valor α , M_α , é:

$$M_\alpha = \{X \in \mathcal{M}_{3 \times 1}(\mathbb{R}) : AX = \alpha X\} = \{X \in \mathcal{M}_{3 \times 1}(\mathbb{R}) : (A - \alpha I_3)X = 0\}.$$

• Seja M_2 o subespaço próprio de A associado ao valor próprio 2. Tem-se:

$$M_2 = \left\{ \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_{3 \times 1}(\mathbb{R}) : (A - 2I_3) \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

Cálculo auxiliar:

$$\begin{aligned} (A - 2I_3|0) &= \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{l_2 + l_1} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{l_3 + l_2} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \\ &\xrightarrow{-l_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\frac{1}{2}l_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{l_1 + l_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \quad (\text{f.e.r.}) \end{aligned}$$

Logo,

$$\begin{aligned} M_2 &= \left\{ \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_{3 \times 1}(\mathbb{R}) : a = b \wedge c = 0 \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} b \\ b \\ 0 \end{bmatrix} : b \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ b \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} : b \in \mathbb{R} \right\} = \left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\rangle. \end{aligned}$$

Concluimos então que a sequência $\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right)$ é uma base de M_2 pois gera M_2 e é linearmente independente (basta notar que $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$). Tem-se, então, que $\text{mg}(2) = \dim M_2 = 1$.

• Seja M_0 o subespaço próprio de A associado ao valor próprio 0. Tem-se:

$$M_0 = \left\{ \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_{3 \times 1}(\mathbb{R}) : (A - 0I_3) \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

Cálculo auxiliar:

$$(A - 0I_3|0) = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{l_2 + (-1)l_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \quad (\text{f.e.r.})$$

Logo,

$$\begin{aligned} M_0 &= \left\{ \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_{3 \times 1}(\mathbb{R}) : a = -b - c \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} -b-c \\ b \\ c \end{bmatrix} : b, c \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ \begin{bmatrix} -b \\ b \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -c \\ 0 \\ c \end{bmatrix} : b, c \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ b \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} : b, c \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\langle \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle. \end{aligned}$$

Concluimos então que a sequência $\left(\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right)$ é uma base de M_0 pois gera M_0 e é linearmente independente (basta ver que $\alpha \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \alpha = \beta = 0$). Tem-se, então, que $\text{mg}(0) = \dim M_0 = 2$.

(c) Uma condição necessária e suficiente para que a matriz A seja diagonalizável, é que a soma das multiplicidades geométricas dos seus valores próprios iguale a ordem da matriz A . Pela alínea anterior, temos

$$\text{mg}(2) + \text{mg}(0) = 3 = \text{ordem de } A,$$

logo A é diagonalizável.

9. Como X e Y são vectores próprios de $A \in \mathcal{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$ associados, respectivamente, aos valores próprios α e β , temos $X, Y \in \mathcal{M}_{n \times 1}(\mathbb{R}) \setminus \{0_{n \times 1}\}$, $AX = \alpha X$ e $AY = \beta Y$. Vejamos que, como A é simétrica (isto é, $A^\top = A$) e $\alpha \neq \beta$, tem-se $X^\top Y = 0$.

Multiplicando ambos os membros da igualdade $AY = \beta Y$, à esquerda, por $X^\top$ obtemos

$$X^\top AY = \beta X^\top Y$$

que é equivalente à igualdade

$$X^\top A^\top Y = \beta X^\top Y$$

pois, por hipótese, A é simétrica. Atendendo a que

$$X^\top A^\top Y = \beta X^\top Y \Leftrightarrow (AX)^\top Y = \beta X^\top Y$$

e como, por hipótese,

$$AX = \alpha X$$

obtemos

$$\begin{aligned} & (\alpha X)^\top Y = \beta X^\top Y \\ \Leftrightarrow & \alpha X^\top Y = \beta X^\top Y \\ \Leftrightarrow & \alpha X^\top Y - \beta X^\top Y = 0 \\ \Leftrightarrow & (\alpha - \beta)X^\top Y = 0. \end{aligned}$$

Dado que, por hipótese, $\alpha \neq \beta$, de $(\alpha - \beta)X^\top Y = 0$ resulta que $X^\top Y = 0$.