

Grelha de Correção do Enunciado A

Análise Matemática I

Repetição do 3º Teste — 27 de Junho de 2017

O Teste compõe-se de 5 questões de escolha múltipla e 5 de resposta aberta. Em cada uma das questões de escolha múltipla apenas uma das alíneas é correcta. Determine-a e assinale-a no quadrado reservado para o efeito na folha de respostas.

Duração: 1H 30M.

Cotação: Nas questões de escolha múltipla, as respostas certas valem 1 valor cada e as respostas erradas descontam 0,2 cada (não se desconta caso não haja resposta). A cotação total do teste é de 20 valores.

1. Seja $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2} (\arcsen(x))^3}$. Então $\int_{1/2}^{\sqrt{2}/2} f(x) dx$ é igual a:

- (a) $\frac{7}{2\pi^2}$. (b) $\frac{7}{\pi^2}$. (c) $\frac{10}{\pi^2}$. (d) $-\frac{10}{\pi^2}$.
-

2. Seja $f(x)$ a solução do problema

$$f'(x) = x \cos(x^2), \text{ com } x \in \mathbb{R} \text{ e } f\left(\sqrt{\frac{\pi}{2}}\right) = 1.$$

O valor de $f(x)$ no ponto $x = -\sqrt{\frac{\pi}{2}}$ é

- (a) 1. (b) -2. (c) -4. (d) -1.
-


3. Considere a seguinte decomposição em fracções simples

$$\frac{A}{x} + \frac{B}{(x+3)^2} + \frac{C}{x+3} + \frac{Dx+E}{\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}},$$

onde A, B, C, D e E são constantes reais. Seja g uma função polinomial de grau menor ou igual a 4. A função racional a que pode corresponder a decomposição anterior é:

- (a) $\frac{g(x)}{(x^2+3x)(x^2-x+1)}$. (c) $\frac{g(x)}{(x^3+6x^2+9x)(x^2+x+1)}$.
(b) $\frac{g(x)}{(x^3+6x^2+9x)(x^2-x+1)}$. (d) $\frac{g(x)}{(x^3-6x^2+9x)(x^2+x+1)}$.
-

4. O eixo das abscissas e o gráfico da função $f : [a, c] \rightarrow \mathbb{R}$ dividem o plano em duas regiões, R_1 e R_2 , indicadas na figura.



Seja A_1 a área da região R_1 e A_2 a área da região R_2 . Então

$$2 \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

é igual a:

- (a) $2A_1 + A_2$. (b) $2A_1 + 3A_2$. (c) $2A_1 + 2A_2$. (d) $2A_1 - A_2$.

5. Seja $f(x) = \int_{k \log(x)}^{3x} e^{-t} dt$, com $x > 0$ e $k \in \mathbb{R}$, tal que $f'(1) = \frac{6}{e^3}$. Considere as afirmações seguintes:

I. $f'(x) = \frac{3}{e^{3x}} - kx^{-1-k}$;

III. $f'(x) = -\frac{3}{e^{3x}} + kx^{-1-k}$;

II. O valor de k é 0;

IV. O valor de k é $-\frac{3}{e^3}$.

A lista completa das afirmações correctas é:

(a) III e IV.

(c) I e IV.

(b) IV.

(d) II e IV.

QUESTÕES DE RESPOSTA ABERTA

1. [2.0 val.] Calcule o valor do seguinte integral:

$$\int_1^4 \sqrt{x} \log(x) dx.$$

Resposta: Seja $h(x) = \sqrt{x} \log(x)$. Consideremos $f(x) = \sqrt{x}$ e $g(x) = \log(x)$. Uma primitiva

de f é $F(x) = \frac{x^{1/2+1}}{1/2+1} = \frac{2}{3} \cdot x^{3/2}$ e $g'(x) = \frac{1}{x}$, portanto,

$$\begin{aligned}\int_1^4 \sqrt{x} \log(x) dx &= \left[\frac{2}{3} \cdot x^{3/2} \log(x) \right]_1^4 - \int_1^4 \frac{2}{3} \cdot x^{3/2} \cdot \frac{1}{x} dx \\ &= \frac{2}{3} \cdot 4^{3/2} \log(4) - \int_1^4 \frac{2}{3} \cdot \sqrt{x} dx \\ &= \frac{16}{3} \log(4) - \frac{2}{3} \left[\frac{2}{3} \cdot x^{3/2} \right]_1^4 \\ &= \frac{16}{3} \log(4) - \frac{4}{9} (4^{3/2} - 1) = \frac{16}{3} \log(4) - \frac{28}{9}.\end{aligned}$$

2. Considere o integral

$$\int_{\pi/4}^{\pi/3} \frac{2 + \sin(x) \cos(x)}{\sin^2(x)(2 - \sin^2(x))} dx.$$

(a) [2.0 val.] Utilize uma substituição conveniente para mostrar que

$$\int_{\pi/4}^{\pi/3} \frac{2 + \sin(x) \cos(x)}{\sin^2(x)(2 - \sin^2(x))} dx = \int_1^{\sqrt{3}} \frac{2t^2 + t + 2}{t^2(t^2 + 2)} dt.$$

(b) [2.5 val.] Calcule o valor do integral.

Resposta: (a) A substituição indicada é $\operatorname{tg}(x) = t = \varphi^{-1}(x)$ o que implica que

$$\varphi^{-1}\left(\frac{\pi}{4}\right) = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1 \quad \text{e} \quad \varphi^{-1}\left(\frac{\pi}{3}\right) = \operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}.$$

Além disso, $x = \varphi(t) = \operatorname{arctg}(t)$ e $\varphi'(t) = \frac{1}{1+t^2}$. Utilizando as fórmulas trigonométricas obtemos $\cos(x) = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}$ e $\sin(x) = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}$.

$$\begin{aligned}\int_{\pi/4}^{\pi/3} \frac{2 + \sin(x) \cos(x)}{\sin^2(x)(2 - \sin^2(x))} dx &= \int_1^{\sqrt{3}} \frac{2 + \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}}{\left(\frac{t}{\sqrt{1+t^2}}\right)^2 \left(2 - \left(\frac{t}{\sqrt{1+t^2}}\right)^2\right)} \cdot \frac{1}{1+t^2} dt \\ &= \int_1^{\sqrt{3}} \frac{2 + \frac{t}{1+t^2}}{\frac{t^2}{1+t^2} \left(2 - \frac{t^2}{1+t^2}\right)} \cdot \frac{1}{1+t^2} dt = \int_1^{\sqrt{3}} \frac{\frac{2t^2 + t + 2}{1+t^2}}{\frac{t^2}{1+t^2} \cdot \frac{2+t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{1}{1+t^2} dt \\ &= \int_1^{\sqrt{3}} \frac{2t^2 + t + 2}{t^2(2+t^2)} dt.\end{aligned}$$

(b) O polinómio $t^2(t^2 + 2)$ tem uma raiz real com multiplicidade 2 e um par de raízes

complexas com multiplicidade 1. Então

$$\begin{aligned}\frac{2t^2 + t + 2}{t^2(2 + t^2)} &= \frac{A}{t^2} + \frac{B}{t} + \frac{Ct + D}{t^2 + 2} \\ &= \frac{A(t^2 + 2) + Bt(t^2 + 2) + (Ct + D)t^2}{t^2(t^2 + 2)} \\ &= \frac{(B + C)t^3 + (A + D)t^2 + 2Bt + 2A}{t^2(t^2 + 2)}.\end{aligned}$$

Pelo método dos coeficientes indeterminados temos

$$\begin{cases} B + C = 0 \\ A + D = 2 \\ 2B = 1 \\ 2A = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 1 \\ B = \frac{1}{2} \\ C = -\frac{1}{2} \\ D = 1, \end{cases}$$

portanto,

$$\frac{2t^2 + t + 2}{t^2(2 + t^2)} = \frac{1}{t^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{t} + \frac{-\frac{1}{2}t + 1}{t^2 + 2}$$

e

$$\begin{aligned}\int_{\pi/4}^{\pi/3} \frac{2 + \sin(x) \cos(x)}{\sin^2(x)(2 - \sin^2(x))} dx &= \int_1^{\sqrt{3}} \frac{2t^2 + t + 2}{t^2(t^2 + 2)} dt \\ &= \int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{t^2} dt + \frac{1}{2} \int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{t} dt - \frac{1}{2} \int_1^{\sqrt{3}} \frac{-\frac{1}{2}t + 1}{t^2 + 2} dt \\ &= \left[-\frac{1}{t} \right]_1^{\sqrt{3}} + \frac{1}{2} \left[\log |t| \right]_1^{\sqrt{3}} - \frac{1}{2} \int_1^{\sqrt{3}} \frac{t}{t^2 + 2} dt + \int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{t^2 + 2} dt \\ &= -\frac{1}{\sqrt{3}} + 1 + \frac{1}{2} \log(\sqrt{3}) - \frac{1}{4} \left[\log(t^2 + 2) \right]_1^{\sqrt{3}} + \int_1^{\sqrt{3}} \frac{\frac{1}{2}}{1 + \left(\frac{t}{\sqrt{2}} \right)^2} dt \\ &= -\frac{1}{\sqrt{3}} + 1 + \frac{1}{2} \log(\sqrt{3}) - \frac{1}{4} \log(5) + \frac{1}{4} \log(3) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\operatorname{arctg} \left(\frac{t}{\sqrt{2}} \right) \right]_1^{\sqrt{3}} \\ &= -\frac{1}{\sqrt{3}} + 1 + \frac{1}{2} \log(\sqrt{3}) + \frac{1}{4} \log\left(\frac{3}{5}\right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\operatorname{arctg} \left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \right) - \operatorname{arctg} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right) \\ &= -\frac{1}{\sqrt{3}} + 1 + \frac{1}{4} \log\left(\frac{9}{5}\right) + \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\operatorname{arctg} \left(\frac{\sqrt{6}}{2} \right) - \operatorname{arctg} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \right).\end{aligned}$$

3. [2.5 val.] Determine a área do domínio plano limitado pelos gráficos das funções

$$f(x) = \sin(2x) \text{ e } g(x) = \cos(x)$$

no intervalo $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right]$.

Resposta: Começemos por determinar os pontos de intersecção dos gráficos das funções. As abcissas desses pontos são obtidas resolvendo a equação $f(x) = g(x)$:

$$\begin{aligned}\sin(2x) = \cos(x) &\Leftrightarrow \cos(x)(2\sin(x) - 1) = 0 \Leftrightarrow \cos(x) = 0 \vee \sin(x) = \frac{1}{2} \\ &\Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi \vee x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \vee x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}.\end{aligned}$$

No intervalo $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ os gráficos das funções intersectam-se nos pontos de abcissas $-\frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{6}$ e $\frac{\pi}{2}$. Como $g(0) = 1$, $f(0) = 0$, $g\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ e $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1$ podemos afirmar que $g(x) \geq f(x)$, $\forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{6}\right]$, e $g(x) \leq f(x)$, $\forall x \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right]$. A área pedida é dada por

$$\begin{aligned}&\int_{-\pi/2}^{\pi/6} (g(x) - f(x)) dx + \int_{\pi/6}^{\pi/2} (f(x) - g(x)) dx \\&= \int_{-\pi/2}^{\pi/6} (\cos(x) - \sin(2x)) dx + \int_{\pi/6}^{\pi/2} (\sin(2x) - \cos(x)) dx \\&= \left[\sin(x) + \frac{\cos(2x)}{2} \right]_{-\pi/2}^{\pi/6} + \left[-\frac{\cos(2x)}{2} - \sin(x) \right]_{\pi/6}^{\pi/2} \\&= \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) + \frac{\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)}{2} - \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) - \frac{\cos(-\pi)}{2} - \frac{\cos(\pi)}{2} - \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) + \frac{\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)}{2} + \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \\&= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}.\end{aligned}$$

4. Considere a função F , real de variável real, definida por

$$F(x) = \int_{-2}^{2x-4} \frac{e^t}{\log(t^2)} dt.$$

(a) [2,0 val.] Determine o domínio de F . Justifique a sua resposta.

(b) [1,5 val.] Calcule a derivada de F . Justifique a sua resposta.

Resposta: (a) A função F é a composição de $h(x) = 2x - 4$ com $G(y) = \int_{-2}^y \frac{e^t}{\log(t^2)} dt$, isto é, podemos escrever $F(x) = G(h(x))$. Designemos por A o domínio de h e por B o domínio de G . O domínio, D , de F é

$$D = \{x \in \mathbb{R} : x \in A \wedge h(x) \in B\}.$$

Temos $A = \mathbb{R}$. Para determinar B começamos por calcular o domínio, C , da função integranda $g(x) = \frac{e^x}{\log(x^2)}$.

$$\begin{aligned}C &= \{x \in \mathbb{R} : x^2 > 0 \wedge \log(x^2) \neq 0\} = \{x \in \mathbb{R} : x \neq 0 \wedge x^2 \neq 1\} \\ &= \{x \in \mathbb{R} : x \neq 0 \wedge x \neq -1 \wedge x \neq 1\} = \mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1\}.\end{aligned}$$

Para que o intervalo de extremos -2 e y esteja contido em C é necessário e suficiente que $y < -1$. Podemos concluir que $B =]-\infty, -1[$. Então

$$D = \{x \in \mathbb{R} : h(x) \in]-\infty, -1[\} = \{x \in \mathbb{R} : 2x - 4 < -1\} = \left] -\infty, \frac{3}{2} \right[.$$

- (b) A função g é contínua em C , portanto, pelo Teorema Fundamental do Cálculo Integral G é diferenciável em $] -\infty, -1[$ e

$$G'(x) = g(x) = \frac{e^x}{\log(x^2)}.$$

Como h é diferenciável em $\mathbb{R}$ podemos afirmar, pelo teorema da derivação da função composta, que F é diferenciável em $] -\infty, \frac{3}{2}[$ e

$$F'(x) = G'(h(x)) \cdot h'(x) = \frac{e^{2x-4}}{\log((2x-4)^2)} \cdot 2 = \frac{2e^{2x-4}}{\log((2x-4)^2)}, \quad \forall x \in] -\infty, \frac{3}{2}[.$$

5. [2.5 val.] Calcule o valor do seguinte integral impróprio:

$$\int_{-\infty}^0 \frac{e^x}{\sqrt{1-e^{2x}}} dx.$$

Resposta: A função integranda tem domínio D ,

$$D = \{x \in \mathbb{R} : 1 - e^{2x} > 0\} = \{x \in \mathbb{R} : x < 0\} =] -\infty, 0[$$

e é contínua nesse conjunto. O intervalo de integração é ilimitado e $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^x}{\sqrt{1-e^{2x}}} = +\infty$, portanto, o integral é impróprio misto. Podemos escrever

$$\int_{-\infty}^0 \frac{e^x}{\sqrt{1-e^{2x}}} dx = \int_{-\infty}^{-1} \frac{e^x}{\sqrt{1-e^{2x}}} dx + \int_{-1}^0 \frac{e^x}{\sqrt{1-e^{2x}}} dx.$$

O integral dado é convergente, se e só se, os dois integrais do segundo membro da igualdade forem convergentes. Por definição

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{-1} \frac{e^x}{\sqrt{1-e^{2x}}} dx &= \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^{-1} \frac{e^x}{\sqrt{1-e^{2x}}} dx \\ &= \lim_{t \rightarrow -\infty} [\arcsen(e^x)]_t^{-1} = \lim_{t \rightarrow -\infty} (\arcsen(e^{-1}) - \arcsen(e^t)) \\ &= \arcsen(e^{-1}) - \arcsen(0) = \arcsen(e^{-1}) \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} \int_{-1}^0 \frac{e^x}{\sqrt{1-e^{2x}}} dx &= \lim_{t \rightarrow 0^-} \int_{-1}^t \frac{e^x}{\sqrt{1-e^{2x}}} dx \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^-} [\arcsen(e^x)]_{-1}^t = \lim_{t \rightarrow 0^-} (\arcsen(e^t) - \arcsen(e^{-1})) \\ &= \arcsen(1) - \arcsen(e^{-1}) = \frac{\pi}{2} - \arcsen(e^{-1}), \end{aligned}$$

portanto,

$$\int_{-\infty}^0 \frac{e^x}{\sqrt{1-e^{2x}}} dx = \frac{\pi}{2}.$$