

Análise Matemática II E

Segundo Teste (1º/12/2018)

Nota: Esta é apenas uma forma de resolução de entre muitas outras possibilidades.

①

a) Seja $f(x, y, z) = e^{zy} \operatorname{sen}(xy) + \cos(y^2) + zx + 1$.

Comencemos por verificar as condições necessárias à aplicação do teorema da função implícita.

$$\textcircled{1} \quad f(-1, 0, 2) = e^{-1 \times 0} \operatorname{sen}(-1 \times 0) + \cos(0^2) + 2(-1) + 1 = \\ = 0 + 1 - 2 + 1 = 0$$

②

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = e^{zy} \cos(xy) y + z$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = e^{zy} z \operatorname{sen}(xy) + e^{zy} \cos(xy) x - \operatorname{sen}(y^2) 2y$$

$$\frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = e^{zy} y \operatorname{sen}(xy) + x$$

Todas as derivadas parciais são funções contínuas em \mathbb{R}^3 pois resultam da soma, produto e composição de funções contínuas (sen , \cos , $\operatorname{exponencial}$ e polinómicas). Assim $f \in C^1(\mathbb{R}^3)$. Em particular,

(2)

f é de classe C^1 numa vizinhança de $(-1, 0, 2)$.

(3)

$$\frac{df}{dy}(-1, 0, 2) = 0 + 1 \times 1 \times (-1) - 0 = -1 \neq 0$$

Logo, pelo teorema da função implícita existem vizinhanças U de $(-1, 2)$ e V de 0 e existe $\phi: U \rightarrow V$ tal que $\phi \in C^1(U)$ e

$$f(x, y, z) = 0 \Leftrightarrow y = \phi(x, z), \forall y \in V, \forall (x, z) \in U$$

b) Pela alínea anterior, como resultado da aplicação do teorema da função implícita, sabemos que $\phi \in C^1(U)$, sendo U uma vizinhança de $(-1, 2)$. Em particular, ϕ é diferenciável em $(-1, 2)$.

Uma aproximação linear a $\phi(-0.09, 1.98)$ pode dada por:

$$\phi(-0.09, 1.98) = \phi(-1 + 0.91, 2 - 0.02) \approx$$

$$\approx \phi(-1, 2) + \nabla \phi(-1, 2)^T \begin{bmatrix} 0.91 \\ -0.02 \end{bmatrix}$$

$$\stackrel{(*)}{=} 0 + [2 \ -1] \begin{bmatrix} 0.91 \\ -0.02 \end{bmatrix} = 1.82 + 0.02$$

$$= 1.84$$

(*)

Ainda pelo teorema da função implícita sabemos que

$$\frac{\partial \phi}{\partial x}(-1,2) = - \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(-1,0,2)}{\frac{\partial f}{\partial y}(-1,0,2)} = 2$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial z}(-1,2) = - \frac{\frac{\partial f}{\partial z}(-1,0,2)}{\frac{\partial f}{\partial y}(-1,0,2)} = -1$$

② Pretendemos

$$\max / \min : x^2 + 2y^2 - x + 3$$

$$\text{s.a. } x^2 + y^2 \leq 1$$

Comencemos por determinar os pontos estacionários de

$$f(x,y) = x^2 + 2y^2 - x + 3$$

que batem com a L.

$$\nabla f(x,y) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 1 = 0 \\ 4y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ y = 0 \end{cases}$$

$(\frac{1}{2}, 0)$ é ponto estacionário de f e batem a L.

(4)

Analisemos agora a fronteira de L , determinando os pontos estacionários da função Lagrangeana

$$L(x, y, \lambda) = x^2 + 2y^2 - x + 3 - \lambda(x^2 + y^2 - 1), \text{ com } \lambda \in \mathbb{R}.$$

$$\nabla L(x, y, \lambda) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 1 - 2\lambda x = 0 \\ 4y - 2\lambda y = 0 \\ -(x^2 + y^2 - 1) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} - \\ y(4 - 2\lambda) = 0 \\ x^2 + y^2 = 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} - \\ y=0 \vee \lambda=2 \\ - \end{cases}$$

Se $y=0$

$$\begin{cases} - \\ x^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} - \\ x = \pm 1 \end{cases}$$

Se $\lambda=2$

$$\begin{cases} 2x - 1 - 4x = 0 \\ - \\ - \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2x = 1 \\ - \\ - \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{2} \\ - \\ y^2 = 1 - \frac{1}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{2} \\ - \\ y^2 = \frac{3}{4} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{2} \\ - \\ y = \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

Assim, $(1, 0), (-1, 0), (-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ e $(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2})$ são pontos estacionários da função Lagrangeana.

(5)

L é um conjunto compacto (fechado e limitado). f é uma função contínua em L , pois é um hipermíndio. Pelo teorema de Weierstrass, f tem um máximo e um mínimo absoluto em L . Os pontos candidatos a pontos de extremo absoluto são os pontos estacionários determinados (para a função e para a função Lagrangeana).

Portanto:

$$f\left(\frac{1}{2}, 0\right) = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + 3 = 3 - \frac{1}{4}$$

$$f(1, 0) = 1 - 1 + 3 = 3$$


$$f(-1, 0) = 1 + 1 + 3 = 5 = 3 + \frac{9}{4}$$

$$f\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = f\left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{1}{4} + \frac{6}{4} + \frac{1}{2} + 3 = 3 + \frac{9}{4}$$

Podemos concluir que a densidade mínima da lâmina ocorre em $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ e a densidade máxima da lâmina ocorre em $\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ e em $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

(3)

(6)



$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta & 0 \leq \theta \leq \omega \operatorname{ctg}(\frac{1}{2}) \\ y = \rho \sin \theta & 0 \leq \rho \leq 2 \cos \theta \end{cases}$$

$$|\mathbf{J}| = \rho$$

$$y = \frac{x}{2} \Leftrightarrow \rho \sin \theta = \frac{\rho \cos \theta}{2}$$

$$\Leftrightarrow \tan \theta = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \theta = \omega \operatorname{ctg}(\frac{1}{2})$$

$$(x-1)^2 + y^2 = 1 \Leftrightarrow x^2 - 2x + 1 + y^2 = 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \rho^2 - 2\rho \cos \theta = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \rho - 2 \cos \theta = 0 \Leftrightarrow \rho = 2 \cos \theta$$

$$\text{Área} = \iint_D 1 \, dxdy = \int_0^{\omega \operatorname{ctg}(\frac{1}{2})} \int_0^{2 \cos \theta} \rho \, d\rho \, d\theta =$$

f)

$$= \int_0^{\omega \operatorname{ctg}(\frac{1}{2})} \left[\frac{\rho^2}{2} \right]_0^{2 \cos \theta} \, d\theta =$$


$$= \int_0^{\omega \operatorname{ctg}(\frac{1}{2})} 2 \cos^2 \theta \, d\theta = \int_0^{\omega \operatorname{ctg}(\frac{1}{2})} 1 + \cos(2\theta) \, d\theta =$$

$$= \left[\theta + \frac{\sin(2\theta)}{2} \right]_0^{\omega \operatorname{ctg}(\frac{1}{2})} = \omega \operatorname{ctg}(\frac{1}{2}) +$$

$$+ \frac{1}{2} \sin\left(2 \omega \operatorname{ctg}(\frac{1}{2})\right)$$

(4)

a)



$$S_1 = D_1 \cup D_2$$

$$D_1 \quad \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 2 \leq z \leq f \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq \sqrt{f-z} \end{aligned}$$

$$z = f - x^2 - y^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow z = f - r^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow r^2 = f - z \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow r = \pm \sqrt{f-z}$$

$$D_2 \quad \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 0 \leq z \leq 2 \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq \sqrt{1+z^2} \end{aligned}$$

$$x^2 + y^2 - z^2 = 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow r^2 - z^2 = 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow r^2 = 1 + z^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow r = \pm \sqrt{1+z^2}$$

$$\text{Volume} = \iiint_{S_1} 1 \, dx \, dy \, dz = \iiint_{D_1} 1 \, dr \, d\theta \, dz + \iiint_{D_2} 1 \, dr \, d\theta \, dz$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{\sqrt{f-z}} r \, dr \, d\theta \, dz$$

$$+ \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{\sqrt{1+z^2}} r \, dr \, d\theta \, dz$$

(b)

$$= 2\pi \int_2^f \left[\frac{r^2}{2} \right]_0^{\sqrt{f-z}} dz + 2\pi \int_0^2 \left[\frac{r^2}{2} \right]_0^{\sqrt{1+z^2}} dz =$$

$$= \pi \int_2^f f - z \, dz + \pi \int_0^2 1 + z^2 \, dz =$$

$$= \pi \left[fz - \frac{z^2}{2} \right]_2^f + \pi \left[z + \frac{z^3}{3} \right]_0^2 =$$


(8)

$$= \pi \left(49 - \frac{49}{2} - 14 + 2 + 2 + \frac{8}{3} \right) =$$

$$= \pi \left(\frac{49}{2} - 10 + \frac{8}{3} \right) = \pi \left(\frac{29}{2} + \frac{8}{3} \right) = \pi \left(\frac{84+16}{6} \right) =$$

$$= \pi \left(\frac{100}{6} \right)$$

(5)



$$\begin{cases} x = \rho \sin \varphi \cos \theta \\ y = \rho \sin \varphi \sin \theta \\ z = \rho \cos \varphi \end{cases}$$

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$2 \cos \varphi \leq \rho \leq 2$$

$$x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 1 \Leftrightarrow$$

$$|J| = \rho^2 \sin \varphi$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 2z + 1 = 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \rho^2 - 2\rho \cos \varphi = 0 \Leftrightarrow$$

$$\begin{matrix} \Leftrightarrow \\ \rho \neq 0 \end{matrix} \rho - 2 \cos \varphi = 0 \Leftrightarrow \rho = 2 \cos \varphi$$

$$\text{Massa} = \iiint_{S_2} z^2 dxdydz = \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_{2 \cos \varphi}^2 \rho^2 \cos^2 \varphi \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$$

⑧)

$$= 2\pi \int_0^{\pi/2} \int_0^2 r^4 \cos^2 \varphi \sin \varphi \, dr \, d\varphi =$$


$$= 2\pi \int_0^{\pi/2} \left[\frac{r^5}{5} \cos^2 \varphi \sin \varphi \right]_0^2 \, d\varphi =$$

$$= 2\pi \int_0^{\pi/2} \frac{32}{5} \cos^2 \varphi \sin \varphi - \frac{32}{5} \cos^4 \varphi \sin \varphi \, d\varphi =$$

$$= 2\pi \left[-\frac{32}{5} \frac{\cos^3 \varphi}{3} + \frac{32}{5} \frac{\cos^8 \varphi}{8} \right]_0^{\pi/2} =$$

$$= 2\pi \left(\frac{32}{15} - \frac{32}{40} \right) = \frac{8}{3}\pi$$

⑨)



$$h \in C^1(\mathbb{R}) \text{ & } h'(z) > 0$$

$$\begin{cases} x = x \cos \theta & 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ y = x \sin \theta & 0 \leq z \leq B \\ z = z & 0 \leq z \leq h(z) \\ |z| = z \end{cases}$$

$$\text{Massa} = \iiint_{S_3} h'(z) \, dx \, dy \, dz = \int_0^{2\pi} \int_a^B \int_0^{h(z)} h'(z) \, dz \, dx \, dy$$

$$= 2\pi \int_a^B \left[\frac{z^2}{2} \right]_0^{h(z)} h'(z) \, dz = \pi \int_a^B h^2(z) h'(z) \, dz =$$

$$= \pi \left[\frac{h^3(z)}{3} \right]_a^B = \pi \left(\frac{h^3(B)}{3} - \frac{h^3(a)}{3} \right)$$

⑩)