

Teoria da Computação

Nome: _____

Número: _____

Segundo Semestre 2016/2017

Mini-teste 1 - A

21/3/2017

Duração: 15 Minutos

Classificar (Sim/Não) _____

Este enunciado tem 5 páginas (incluindo esta) e 6 questões.

Apenas voltar a página quando o professor assim o disser. A folha de respostas múltiplas está anexa a este enunciado. Qualquer pergunta errada desconta 1/3 do seu valor no total da pontuação obtida com as respostas certas.

Tabela de Pontuação

Question	Points	Score
1	10	
2	20	
3	20	
4	10	
5	20	
6	20	
Total:	100	

1. (10 points) Pretende-se definir o conjunto C de todos os números naturais (de NAT) ímpares menores que 10. A definição por compreensão correspondente é (escolha a verdadeira):

A. $C \stackrel{\text{abv}}{=} \{x \in NAT \mid x \leq 10 \wedge x \% 2 = 1\}$

B. $C \stackrel{\text{abv}}{=} \{1, 3, 5, 7, 9\}$

C. $C \stackrel{\text{abv}}{=} \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\} \cup \{x \in NAT \mid x \% 2 = 1\}$

D. BASE: $1 \in IMP10$

SEGUINTE: $((n + 2 \leq 10) \wedge (n \in IMP10)) \longrightarrow n + 2 \in IMP10$

E. Nenhuma das Anteriores

2. (20 points) Escolha a opção correcta que define por indução o conjunto $MULT5$ dos números naturais múltiplos de 5.

A.

BASE : $0 \in MULT5$

SEGUINTE : $(n \in MULT5) \longrightarrow n + 5 \in MULT5$

B.

BASE : $1 \in MULT5$

SEGUINTE : $(n \in MULT5) \longrightarrow n + 5 \in MULT5$

C.

BASE : $0 \in MULT5$

SEGUINTE : $(n \in MULT5) \longrightarrow n * 5 \in MULT5$

D.

BASE : $0 \in MULT5$

SEGUINTE : $(n + 5) \in MULT5 \longrightarrow n \in MULT5$

E.

BASE : $1 \in MULT5$

SEGUINTE : $(n \in MULT5) \longrightarrow n * 5 \in MULT5$

3. (20 points) Escolha a opção correcta que define indutivamente a função **concat** entre duas sequências SEQ (sequências finitas de naturais em NAT).

Exemplo **concat**((1,(2,(3))), (4,(5,(6))))=(1,(2,(3,(4,(5,(6)))))):

- A. $\text{concat} \in \text{SEQ} \times \text{SEQ} \rightarrow \text{SEQ}$
 Sejam $n \in \text{NAT}$ e $s, s_0, s_1 \in \text{SEQ}$.
 BASE: $\text{concat}(() , s) = s$
 PASSO: $\text{concat}((n, s_0), s_1) = (n, \text{concat}(s_0, s_1))$
- B. $\text{concat} \in \text{SEQ} \times \text{SEQ} \rightarrow \text{SEQ}$
 Sejam $n \in \text{NAT}$ e $s \in \text{SEQ}$.
 BASE: $\text{concat}(() , s) = s$
 PASSO: $\text{concat}((n, s)) = (n, s)$
- C. $\text{concat} \in \text{SEQ} \times \text{SEQ} \rightarrow \text{SEQ}$
 Sejam $n \in \text{NAT}$ e $s \in \text{SEQ}$.
 BASE: $\text{concat}(()) = ()$
 PASSO: $\text{concat}((n, s)) = (n, \text{concat}(s))$
- D. $\text{concat} \in \text{SEQ} \times \text{SEQ} \rightarrow \text{SEQ}$
 Sejam $n_1, n_2 \in \text{NAT}$ e $s, s_1, s_2 \in \text{SEQ}$.
 BASE: $\text{concat}(n_1, n_2) = (n_1, (n_2))$
 PASSO: $\text{concat}((n, s_1), s_2) = (n, \text{concat}(s_1, s_2))$
- E. $\text{concat} \in \text{SEQ} \times \text{SEQ} \rightarrow \text{SEQ}$
 Sejam $s_1, s_2 \in \text{SEQ}$.
 BASE: $\text{concat}(() , ()) = (() , ())$
 PASSO: $\text{concat}(s_1, s_2) = (s_1, s_2)$
4. (10 points) Qual das seguintes expansões de abreviaturas está incorreta?
- A. $\neg(\neg\varphi \wedge \psi) \stackrel{\text{abv}}{=} ((\varphi \rightarrow \perp) \wedge \psi) \rightarrow \perp$
- B. $\neg\varphi \leftrightarrow (\psi \vee \delta) \stackrel{\text{abv}}{=} ((\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow (\psi \vee \delta)) \wedge ((\psi \vee \delta) \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp))$
- C. $(\neg(A \vee B) \rightarrow \neg A) \stackrel{\text{abv}}{=} (((A \vee B) \rightarrow \perp) \rightarrow (A \rightarrow \perp))$
- D. $((\neg B) \vee \top) \rightarrow ((\neg B) \vee \top) \stackrel{\text{abv}}{=} (((B \rightarrow \perp) \vee (\perp \rightarrow \perp)) \rightarrow ((B \rightarrow \perp) \vee (\perp \rightarrow \perp)))$
- E. Nenhuma das anteriores

5. (20 points) Qual das seguintes respostas correspondem à derivação correcta da fórmula de primeira ordem $temConta(username(x))$ sabendo que a assinatura é tal que: $SF_0 = \{Fonseca\}$, $SF_1 = \{username\}$, $SP_1 = \{temConta\}$ e $x \in X$

- A.
$$\frac{\frac{x \in T_\Sigma^X \quad username \in SP_1}{username(x) \in T_\Sigma^X} \text{ (FUN)} \quad temConta \in SP_1}{temConta(username(x)) \in F_\Sigma^X} \text{ (PRED)}$$
- B.
$$\frac{\frac{x \in X}{x \in T_\Sigma^X} \text{ (VAR)} \quad username \in SP_1}{username(x) \in T_\Sigma^X} \text{ (PRED)} \quad temConta \in SP_1}{temConta(username(x)) \in F_\Sigma^X} \text{ (PRED)}$$
- C.
$$\frac{\frac{x \in X}{x \in T_\Sigma^X} \text{ (VAR)} \quad username \in SP_1}{username(x) \in T_\Sigma^X} \text{ (FUN)} \quad temConta \in SP_1}{temConta(username(x)) \in F_\Sigma^X} \text{ (FUN)}$$
- D.
$$\frac{\frac{x \in X}{x \in T_\Sigma^X} \text{ (VAR)} \quad username \in SF_1}{username(x) \in T_\Sigma^X} \text{ (FUN)} \quad temConta \in SP_1}{temConta(username(x)) \in F_\Sigma^X} \text{ (PRED)}$$

E. Nenhuma das anteriores.

6. (20 points) Considere a fórmula de primeira ordem $((B \rightarrow \perp) \wedge A)$. Sabendo que a assinatura é tal que: $SF_0 = \emptyset$, $SP_0 = \{A, B\}$ e $X = \emptyset$

Qual das seguintes respostas corresponde à derivação correcta da fórmula dada:

$$\text{A. } \frac{\frac{A \in SP_0}{A \in F_\Sigma^X} \text{ (PROP)} \quad \frac{\frac{\perp \in F_\Sigma^X \text{ (BOT)}}{B \in F_\Sigma^X} \text{ (PROP)}}{(B \rightarrow \perp) \in F_\Sigma^X} \text{ (IMP)} \quad \frac{}{((B \rightarrow \perp) \wedge A) \in F_\Sigma^X} \text{ (CON)}$$

$$\text{B. } \frac{\frac{A \in SP_0}{A \in F_\Sigma^X} \text{ (PRED)} \quad \frac{\frac{\perp \in F_\Sigma^X \text{ (BOT)}}{B \in F_\Sigma^X} \text{ (PRED)}}{(B \rightarrow \perp) \in F_\Sigma^X} \text{ (IMP)} \quad \frac{}{((B \rightarrow \perp) \wedge A) \in F_\Sigma^X} \text{ (CON)}$$

$$\text{C. } \frac{\frac{A \in SP_0}{A \in F_\Sigma^X} \text{ (FUN)} \quad \frac{\frac{\perp \in F_\Sigma^X \text{ (BOT)}}{B \in F_\Sigma^X} \text{ (FUN)}}{(B \rightarrow \perp) \in F_\Sigma^X} \text{ (IMP)} \quad \frac{}{((B \rightarrow \perp) \wedge A) \in F_\Sigma^X} \text{ (CON)}$$

$$\text{D. } \frac{\frac{A \in SP_0}{A \in F_\Sigma^X} \text{ (CONST)} \quad \frac{\frac{\perp \in F_\Sigma^X \text{ (BOT)}}{B \in F_\Sigma^X} \text{ (CONST)}}{(B \rightarrow \perp) \in F_\Sigma^X} \text{ (IMP)} \quad \frac{}{((B \rightarrow \perp) \wedge A) \in F_\Sigma^X} \text{ (CON)}$$

- E. Não é aplicável (não existe regra). Trata-se de uma fórmula proposicional e não de primeira ordem.