1.7 Cálculo integral

Motivação

Consideremos uma função contínua $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f \geq 0$ em $[a, b]$.

Pretende-se calcular a área da região $\mathcal{R}$ delimitada pelo gráfico de f e pelo eixo dos xx ,

$$\mathcal{R} = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, \quad 0 \leq y \leq f(x) \},$$

que se encontra assinalada na seguinte figura.

Designamos esta área por **integral de f em $[a, b]$** , que denotamos por

$$\int_a^b f(x) dx.$$

A função f designa-se por **função integranda**.

Exemplos

1. Se f é a função constante de valor k , o valor da área é $k(b - a)$,

Portanto,

$$\int_a^b k \, dx = k(b - a).$$

2. Mais geralmente, se f é uma função linear o valor da área é

$$\frac{f(a) + f(b)}{2}(b - a),$$

como se pode constatar imediatamente na seguinte figura.

Portanto,

$$\int_a^b f(x) \, dx = \frac{f(a) + f(b)}{2}(b - a).$$

- Podemos estender a noção de integral para funções contínuas f que tomam valores positivos e negativos. Nessa altura, define-se integral de f em $[a, b]$ como sendo a diferença entre os valores das áreas das regiões delimitadas pelo gráfico de f e pelo o eixo dos xx , que se encontram acima e abaixo do eixo dos xx , respectivamente.

Fórmula fundamental do cálculo integral

O cálculo do valor da área delimitada pelo gráfico de uma função contínua $f \geq 0$ e pelo eixo dos xx não é trivial. Podemos no entanto obter um valor aproximado dessa área subdividindo o intervalo $[a, b]$ em n subintervalos de igual amplitude h , $[a_i, a_{i+1}]$, $i = 0, \dots, n - 1$, com $a_{i+1} = a_i + h$, de forma a que f seja aproximadamente constante de valor $f(a_i)$ em $[a_i, a_{i+1}]$.

Nessa altura, um valor aproximado da área é dado pela soma das áreas dos n rectângulos, de base h e alturas $f(a_0), \dots, f(a_{n-1})$, isto é, pela expressão

$$f(a_0)h + f(a_1)h + \dots + f(a_{n-1})h = (f(a_0) + f(a_2) + \dots + f(a_{n-1}))h.$$

Intuitivamente a aproximação será tanto melhor quanto mais pequeno for a amplitude h dos subintervalos $[a_i, a_{i+1}]$, tendo-se que a soma anterior converge para a área quando $h \rightarrow 0$.

Por outro lado, se considerarmos uma primitiva F de f , obtém-se atendendo à definição de derivada,

$$f(a_i) = F'(a_i) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(a_i + h) - F(a_i)}{h}.$$

Se h é suficientemente pequeno, vem

$$f(a_i) \approx \frac{F(a_i + h) - F(a_i)}{h} = \frac{F(a_{i+1}) - F(a_i)}{h}.$$

e portanto,

$$\begin{aligned} & (f(a_0) + f(a_1) + \cdots + f(a_{n-1})) h \\ \approx & \left(\frac{F(a_1) - F(a_0)}{h} + \frac{F(a_2) - F(a_1)}{h} + \cdots + \frac{F(a_n) - F(a_{n-1})}{h} \right) h \\ = & F(a_1) - F(a_0) + F(a_2) - F(a_1) + F(a_3) - F(a_2) + \cdots \\ & \cdots + F(a_{n-2}) - F(a_{n-3}) + F(a_{n-1}) - F(a_{n-2}) + F(a_n) - F(a_{n-1}). \end{aligned}$$

Na expressão anterior cada parcela $F(a_i)$ aparece duas vezes e com sinais opostos, com exceção das parcelas $-F(a_0)$ e $F(a_n)$ que só figuram uma vez. Logo,

$$(f(a_0) + f(a_1) + \cdots + f(a_{n-1})) h \approx -F(a_0) + F(a_n) = F(b) - F(a).$$

Esta aproximação será tanto melhor quanto mais pequeno for a amplitude h dos subintervalos $[a_i, a_{i+1}]$. Pode-se provar que no limite, quando $h \rightarrow 0$, se obtém mesmo uma igualdade. Atendendo às considerações anteriores, concluímos finalmente que

$$\text{Área da região} = F(b) - F(a).$$

Obtivemos assim uma fórmula surpreendente que relaciona dois conceitos aparentemente desconexos, a saber, o conceito de integral que envolve a noção de área e o conceito de primitiva, que envolve a noção de derivada. Esta fórmula é conhecida por **fórmula fundamental do cálculo integral** (ou **fórmula de Barrow**).

As conclusões anteriores mantêm-se válidas se f tomar valores positivos e negativos.

Tem-se então o seguinte resultado.

Teorema Sejam $f : I = [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua e $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ uma primitiva de f . Então

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a).$$

Exemplos

1. $\int_a^b k dx = k \int_a^b 1 dx = k[x]_a^b = k(b - a).$

2. $\int_0^1 x dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}.$

3. Pretende-se calcular $\int_2^6 \sqrt{x+1} dx.$

Recordemos que $P f' f^\alpha = \frac{f^{\alpha+1}}{\alpha+1}$ ($\alpha \neq -1$). Assim,

$$\begin{aligned} \int_2^6 \sqrt{x+1} dx &= \int_2^6 (x+1)^{\frac{1}{2}} dx = \left[\frac{(x+1)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right]_2^6 \\ &= \frac{2}{3} \left[(x+1)^{\frac{3}{2}} \right]_2^6 = \frac{2}{3} (7^{\frac{3}{2}} - 3^{\frac{3}{2}}). \end{aligned}$$

4. Pretende-se calcular $\int_1^3 e^{-x} dx.$

Recordando que $P(f'e^f) = e^f$, vem

$$\int_1^3 e^{-x} dx = - \int_1^3 -e^{-x} dx = - [e^{-x}]_1^3 = -(e^{-3} - e^{-1}) = e^{-1} - e^{-3}.$$

5. Pretende-se calcular $\int_1^3 |2-x| dx.$

$$\text{Tem-se } |2-x| = \begin{cases} 2-x, & 2-x \geq 0 \\ x-2, & 2-x \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} 2-x, & 1 \leq x \leq 2 \\ x-2, & 2 \leq x \leq 3 \end{cases}.$$

Assim

$$\begin{aligned}
 \int_1^3 |2-x| dx &= \int_1^2 (2-x) dx + \int_2^3 (x-2) dx \\
 &= \left[2x - \frac{x^2}{2} \right]_1^2 + \left[\frac{x^2}{2} - 2x \right]_2^3 \\
 &= (4-2) - \left(2 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{9}{2} - 6 \right) - (2-4) = 1.
 \end{aligned}$$

6. Pretende-se calcular $\int_1^e \ln x dx$.

Primitivando por partes vem

$$P 1 \cdot \ln x = x \ln x - P x \frac{1}{x} = x \ln x - x = x(\ln x - 1),$$

e portanto,

$$\int_1^e \ln x dx = [x(\ln x - 1)]_1^e = e(1-1) - (-1) = 1.$$

7. Pretende-se calcular $\int_0^1 \frac{\operatorname{arctg} x}{1+x^2} dx$.

Recordando que $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}$ e que $P f' f = \frac{1}{2} f^2$ obtemos

$$P \frac{\operatorname{arctg} x}{1+x^2} = P \frac{1}{1+x^2} \operatorname{arctg} x = \frac{1}{2} \operatorname{arctg}^2 x.$$

Portanto,

$$\int_0^1 \frac{\operatorname{arctg} x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} [\operatorname{arctg}^2 x]_0^1 = \frac{1}{2} (\operatorname{arctg}^2 1 - \operatorname{arctg}^2 0) = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{4} \right)^2 = \frac{\pi^2}{32}.$$

8. Pretende-se calcular $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{\operatorname{arctg} x(1+x^2)}$.

Recordando que $P \frac{f'}{f} = \ln |f|$,

$$P \frac{1}{\operatorname{arctg} x(1+x^2)} = P \frac{\frac{1}{1+x^2}}{\operatorname{arctg} x} = \log |\operatorname{arctg} x|,$$

e portanto,

$$\begin{aligned} \int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{\operatorname{arctg} x(1+x^2)} &= \left[\log |\operatorname{arctg} x| \right]_1^{\sqrt{3}} = \log |\operatorname{arctg} \sqrt{3}| - \log |\operatorname{arctg} 1| \\ &= \log \frac{\pi}{3} - \log \frac{\pi}{4} = \log \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

9. Pretende-se calcular, $\int_{-\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{x dx}{\sqrt{1-x^4}}$.

Recordando que $(\operatorname{arcsen} x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, e que

$$(\operatorname{arcsen} f)' = \frac{1}{\sqrt{1-f^2}} f' = \frac{f'}{\sqrt{1-f^2}},$$

vem

$$P \frac{x}{\sqrt{1-x^4}} = \frac{1}{2} P \frac{2x}{\sqrt{1-(x^2)^2}} = \frac{1}{2} \operatorname{arcsen} x^2,$$

e portanto,

$$\int_{-\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{x dx}{\sqrt{1-x^4}} = \frac{1}{2} \left[\operatorname{arcsen} x^2 \right]_{-\frac{\sqrt{2}}{2}}^{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{1}{2} \left(\operatorname{arcsen} \frac{1}{2} - \operatorname{arcsen} \frac{1}{2} \right) = 0.$$

10. Pretende-se calcular, $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2-4}$.

A função $\frac{1}{x^2-4}$ é uma função racional própria pois é um quociente de dois polinómios, sendo que o grau do denominador superior ao do numerador. O polinómio x^2-4 tem duas raízes simples $-2, 2$ e portanto admite a factorização $x^2-4 = (x+2)(x-2)$. Assim existem constantes reais A, B tais

que

$$\begin{aligned}\frac{1}{x^2 - 4} &= \frac{1}{(x - 2)(x + 2)} = \frac{A}{x - 2} + \frac{B}{x + 2} \\ &= \frac{A(x + 2) + B(x - 2)}{(x - 2)(x + 2)} = \frac{(A + B)x + 2(A - B)}{x^2 - 4},\end{aligned}$$

e portanto

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ 2(A - B) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} B = -A \\ 4A = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} B = -\frac{1}{4} \\ A = \frac{1}{4}. \end{cases}$$

Daqui resulta que

$$\frac{1}{x^2 - 4} = \frac{1}{4(x - 2)} - \frac{1}{4(x + 2)}$$

e portanto

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2 - 4} &= \int_{-1}^1 \left[\frac{1}{4(x - 2)} - \frac{1}{4(x + 2)} \right] dx \\ &= \frac{1}{4} \int_{-1}^1 \frac{dx}{x - 2} - \frac{1}{4} \int_{-1}^1 \frac{dx}{x + 2} \\ &= \frac{1}{4} \left[\log |x - 2| - \log |x + 2| \right]_{-1}^1 \\ &= \frac{1}{4} (\log 1 - \log 3 - \log 3 + \log 1) = -\frac{\log 3}{2}.\end{aligned}$$

Propriedades do integral

Sejam $f, g : I = [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ funções contínuas em $[a, b]$, $\lambda \in \mathbb{R}$ e $c \in [a, b]$. Tem-se:

- **Linearidade do integral:**

1. $\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx.$
2. $\int_a^b \lambda f(x) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx.$

- **Monotonia do integral:** se $f(x) \geq g(x)$ para todo o $x \in I$ tem-se,

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx.$$

- **Aditividade do integral:**

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

Por convenção tem-se ainda:

- $\int_a^a f(x) dx = 0,$
- $\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx = 0.$

Exemplos

1. Sabendo que

$$\int_0^1 x dx = \frac{1}{2} \quad \text{e que} \quad \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3},$$

obtemos pelas propriedades anteriores

$$\begin{aligned} \int_0^1 (x + 5x^2) dx &= \int_0^1 x dx + \int_0^1 5x^2 dx \\ &= \int_0^1 x dx + 5 \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{2} + \frac{5}{3} = \frac{13}{6}. \end{aligned}$$

2. Pretende-se comparar os integrais $\int_0^1 x^2 dx$ e $\int_0^1 \sqrt{x} dx$ sem os determinar.

Ora, como a função $\sqrt{x} \geq x^2$ em $[0, 1]$, vem pela monotonia do integral que

$$\int_0^1 x^2 dx \leq \int_0^1 \sqrt{x} dx.$$

O que aconteceria se os integrais estivessem definidos no intervalo $[1, 2]$?

Como vimos anteriormente, o valor da área da região delimitada pelo eixo dos xx e pelo gráfico de uma função contínua $f \geq 0$ num intervalo $[a, b]$, é dado por

$$\int_a^b f(x) dx.$$

No caso $f \leq 0$, o integral representa o simétrico do valor da área dessa região.

Exemplo

Consideremos a função $f(x) = \sin x$ em $[-\pi, \pi]$. No intervalo $[0, \pi]$ temos $f(x) \geq 0$ e no intervalo $[-\pi, 0]$ temos $f(x) \leq 0$. As áreas em cada um dos sub-intervalos são iguais mas os integrais têm sinais contrários. Assim,

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin x \, dx = \int_{-\pi}^0 \sin x \, dx + \int_0^{\pi} \sin x \, dx = 0.$$

Aplicações do cálculo integral

- Cálculo de áreas.
- Cálculo de volumes de sólidos de revolução.

Cálculo de áreas

Teorema Sejam $f, g : I = [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ são funções contínuas tais que $f(x) \geq g(x)$ para todo o $x \in [a, b]$. A área da região

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, \quad g(x) \leq y \leq f(x)\}.$$

é dada pelo integral $\int_a^b (f(x) - g(x)) dx$.

Se o sinal de $f - g$ não for constante no intervalo $[a, b]$ temos que determinar os pontos onde os gráficos de ambas as funções se intersectam e decompôr o intervalo em subintervalos onde esse sinal se mantenha constante. O valor da área será então a soma das áreas em cada um desses subintervalos. No exemplo descrito na seguinte figura a área da região assinalada vem dada pelo integral

$$\int_a^c (g(x) - f(x)) dx + \int_c^d (f(x) - g(x)) dx + \int_d^b (g(x) - f(x)) dx.$$

Exemplos

1. Calcular a área da região delimitada por $y = |x|$ e $y = 2 - x^2$.

$$\begin{aligned}
 \text{Área} &= \int_{-1}^1 ((2 - x^2) - |x|) dx \\
 &= \int_{-1}^0 ((2 - x^2) - (-x)) dx + \int_0^1 ((2 - x^2) - x) dx \\
 &= \left[2x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right]_{-1}^0 + \left[2x - \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 \\
 &= -2(-1) - \frac{(-1)^3}{3} + \frac{(-1)^2}{2} + \left(2 - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) = \frac{7}{3}.
 \end{aligned}$$

2. Pretende-se calcular a área da região

$$\left\{ (x, y) : 0 \leq y \leq \frac{1}{x}, \frac{x}{4} \leq y \leq 2x, \right\}.$$

Para isso necessitamos de determinar os pontos de intersecção dos gráficos de cada uma das funções. Ora, a intersecção da hipérbole $y = \frac{1}{x}$ com a recta

$y = 2x$ obtém-se resolvendo o sistema

$$\begin{cases} y = \frac{1}{x} \\ y = 2x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{1}{x} \\ \frac{1}{x} = 2x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{1}{x} \\ x^2 = 2. \end{cases}$$

Como $y \geq 0$ obtemos o ponto $(\frac{\sqrt{2}}{2}, \sqrt{2})$. Analogamente a intersecção da hipérbole $y = \frac{1}{x}$ com a recta $y = \frac{x}{4}$ obtém-se resolvendo o sistema

$$\begin{cases} y = \frac{1}{x} \\ y = \frac{x}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{1}{x} \\ \frac{1}{x} = \frac{x}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = \frac{1}{x} \\ x^2 = 4. \end{cases}$$

Como $y \geq 0$ obtemos o ponto $(2, \frac{1}{2})$. Assim,

$$\begin{aligned} \text{Área} &= \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \left(2x - \frac{x}{4}\right) dx + \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^2 \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{4}\right) dx \\ &= \frac{7}{4} \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} + \left[\log|x| - \frac{x^2}{8}\right]_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^2 = \dots \end{aligned}$$

Cálculo de volumes de sólidos de revolução

Vejamos agora como calcular o *volume de sólidos de revolução* usando o integral definido.

Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função contínua tal que $f(x) \geq 0$. Seja $V \subset \mathbb{R}^3$ o sólido de revolução em torno do eixo do xx definido por f , i.e., o volume da região definida por rotação da área

$$\{(x, y) : a \leq x \leq b, 0 \leq y \leq f(x)\},$$

em torno do eixo do xx .

Teorema O volume do sólido de revolução definido por $y = f(x)$ é dado pela fórmula,

$$V = \int_a^b \pi f^2(x) dx.$$

Exemplo

Pretende-se calcular o volume do cone de altura $h = 1$ e cuja base é uma disco de raio $R = 1$. O cone é o sólido de revolução definido pela função $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x$.

O volume do cone é dado por

$$V = \int_0^1 \pi x^2 dx = \pi \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{\pi}{3}.$$