

Nome: _____ Número: _____

Nº Caderno: _____

Total de folhas entregues: ____

1ª Parte

- [1.5] 1. Considere funções f e g diferenciáveis e os valores na seguinte tabela:

	f	g	f_x	f_y
$(0, 1)$	2	5	3	7
$(-1, 1)$	5	2	6	4

Calcule:

- (a) $g_u(0, 1)$ sabendo que $g(u, v) = f(-1 + \cos(u + \frac{\pi}{2}v), ve^u)$;

$$g_u(0, 1) = f_x(-1, 1) \left[-\sin(u + \frac{\pi}{2}v) \right]_{(u,v)=(0,1)} + f_y(-1, 1) \left[ve^u \right]_{(u,v)=(0,1)} = 6 \times (-1) + 4 \times 1 = -2$$

- (b) $g_s(-1, 1)$ sabendo que $g(r, s) = f(r^2s + r, \log(-ers))$.

$$g_s(-1, 1) = f_x(0, 1) \left[r^2 \right]_{(r,s)=(-1,1)} + f_y(0, 1) \left[\frac{1}{s} \right]_{(r,s)=(-1,1)} = 3 \times 1 + 7 \times 1 = 10$$

- [1.5] 2. Suponha que um objecto se encontra na posição $(1, 1, \frac{\pi}{4})$ e pretende deslocar-se sobre a superfície correspondente ao gráfico da função $f(x, y) = \arctan(xy)$.

- (a) Indique o declive que o objecto encontrará se se mover na direcção paralela ao eixo dos x 's e segundo o sentido positivo deste.

$$\text{O declive é dado por } f_x(1, 1) = \left[\frac{y}{1 + (xy)^2} \right]_{(x,y)=(1,1)} = \frac{1}{2}$$

- (b) Indique o declive que o objecto encontrará se se mover em direcção ao ponto $(x, y) = (0, 2)$.

$$\text{O declive é dado por } D_{\vec{u}}f(1, 1) = \nabla f(1, 1) \cdot \vec{u} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right) \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = 0, \text{ sendo } \vec{u} \text{ o vector unitário com direcção e sentido de } (-1, 1) = (0, 2) - (1, 1).$$

- (c) Qual a direcção que o objecto deve seguir se pretender subir mais rapidamente?

$$\text{O objecto deve seguir a direcção do vector } \nabla f(1, 1) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right).$$

- [1.5] 3. Considere a função $f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^2 + xy^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ cujo gradiente no ponto $(0, 0)$ é $(0, 1)$. Determine a

derivada direccional $D_{\vec{u}}f(0, 0)$, sendo $\vec{u}$ o vector unitário $(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$. Será f diferenciável em $(0, 0)$? Justifique a resposta.

$$\text{Ora } \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f((0,0) + h(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})) - f(0,0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\frac{1}{2}h^2 + \frac{1}{2\sqrt{2}}h^3}{\frac{1}{2}h^2 + \frac{1}{2\sqrt{2}}h^3}}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}h^2 + \frac{1}{2\sqrt{2}}h^3}{h|h|} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{2} \frac{h}{|h|} + \frac{1}{2\sqrt{2}} \frac{h^3}{|h|} \right) = \pm \frac{1}{2}. \text{ Logo,}$$


$D_{\vec{u}}f(0,0)$ não existe. Portanto, a função f não é diferenciável, pois se o fosse teríamos de ter $D_{\vec{u}}f(0,0) = \nabla f(0,0) \cdot \vec{u} = (0,0) \cdot (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}) = 0$.

- [1.5] 4. Determine uma equação do plano tangente ao gráfico da função $f(x, y) = xy^3 - 2yx + 2$ no ponto $P(2, 1, 0)$.

Uma equação do plano tangente é dada por $z - z_0 = f_x(2, 1)(x - x_0) + f_y(2, 1)(y - y_0)$ com $(x_0, y_0, z_0) = (2, 1, 0)$, ou seja, $z - 0 = -1(x - 2) + 2(y - 1)$.

- [2.0] 5. Considere o seguinte integral $\int_1^2 \int_0^{\log x} f(x, y) dy dx$. Elabore um esboço da região de integração e inverta a ordem de integração.

A região de integração é




podendo o mesmo integral ser representado na forma

$$\int_0^{\log 2} \int_{e^y}^2 f(x, y) dx dy$$

- [2.0] 6. Escreva um integral iterado que permita calcular a área da região do plano xOy limitada pelas parábolas de equação $y = 2x^2$ e $y = 1 + x^2$. (Não precisa de determinar o valor do integral.)

A área pedida pode ser calculada usando o integral

$$\int_{-1}^1 \int_{2x^2}^{1+x^2} 1 dy dx$$



7. (Pergunta bônus: A resposta a esta pergunta é facultativa. A sua cotação é de 1.5 valores. O total da cotação obtida com as respostas às perguntas 1 a 7 - inclui pergunta bônus - não ultrapassará os 10 valores.)

Determine o declive da recta tangente à curva $(x^2 + y^2 - 2x)^2 = 4(x^2 + y^2)$ no ponto $(0, 2)$.

O declive é dado por $\frac{dy}{dx}(0) = - \frac{f_x(0, 2)}{f_y(0, 2)} = \left[- \frac{2(x^2 + y^2 - 2x)(2x - 2) - 8x}{2(x^2 + y^2 - 2x) \cdot 2y - 8y} \right]_{(x, y) = (0, 2)} = 1$

sendo $f(x, y) = (x^2 + y^2 - 2x)^2 - 4(x^2 + y^2)$

2ª Parte

Atenção: As respostas às perguntas seguintes devem ser cuidadosamente justificadas em folha(s) do caderno de prova, devidamente identificada(s), com o nome e o número de aluno.

- [5.0] 8. (a) Determine os extremos relativos da função $f(x, y) = 4xy - 2x^2 - y^4$.
 (b) Indique os extremos absolutos de $g(x, y) = xy$ no conjunto $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + 2y^2 = 1\}$.
- [5.0] 9. (a) Efectuando uma mudança de variáveis para coordenadas cilíndricas calcule $\iiint_E e^z dV$, onde E é a região do primeiro octante limitada pelo parabolóide $z = 1 + x^2 + y^2$ e interior ao cilindro $x^2 + y^2 = 5$.
 (b) Efectue uma mudança de variáveis de acordo com a transformação $T(u, v) = (x - y, x + y)$ para mostrar que $\iint_R (x - y)^2 dA = \frac{8}{3}$, onde R é o paralelogramo de vértices $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(2, 0)$ e $(1, -1)$.

8(a) Os extremos de f serão solução do sistema

$$\begin{cases} f_x(x,y)=0 \\ f_y(x,y)=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4y-4x=0 \\ 4x-4y^3=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=y \\ 4y(1-y^2)=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=y \\ y=0 \vee y=1 \vee y=-1 \end{cases}$$

ou seja, podem ser $(0,0)$, $(1,1)$ ou $(-1,1)$.

A matriz Hessiana de f é $\begin{bmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 4 \\ 4 & -12y^2 \end{bmatrix}$.

No ponto $(0,0)$ o hessiano é $-16 < 0$, donde se conclui que em $(0,0)$ temos um ponto de sela.

Nos pontos $(1,1)$ e $(-1,-1)$ o hessiano é $32 > 0$ sendo o valor de $f_{xx}(1,1) = f_{xx}(-1,-1) = -4 < 0$. Logo, a função f atinge em $(1,1)$ e em $(-1,-1)$ um valor de máximos relativo.

b) O conjunto D é limitado e fechado pelo que g atinge um máximo e um mínimos absolutos em D . Esses extremos serão solução do sistema $\nabla g = \lambda \nabla h$, onde $\lambda \in \mathbb{R}$ e $h(x,y) = x^2 + 2y^2$, em D .

$$\text{Ora } \nabla g = \lambda \nabla h \Leftrightarrow \begin{cases} y = \lambda 2x \\ x = \lambda 4y \end{cases} \Leftrightarrow \lambda = \frac{y}{2x} = \frac{x}{4y}$$

(Note-se que $x \neq 0$ e $y \neq 0$, pois caso contrário $(x,y) \notin D$.)

Assim, temos $2y^2 = x^2$. Como $x^2 + 2y^2 = 1$, então $x^2 = \frac{1}{2}$, ou seja, $x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$. Temos também $y^2 = \frac{1}{4}$, ou

seja, $y = \pm \frac{1}{2}$. As soluções em D do sistema são:

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2}\right), \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{2}\right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2}\right) \text{ e } \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{2}\right).$$

Ora $g\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2}\right) = g\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2\sqrt{2}}$ é o máximo e

$g\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{2}\right) = g\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2\sqrt{2}}$ é o mínimo.

9(a) A região de integração pode ser descrita usando coordenadas cilíndricas do seguinte modo:


$$E = \{(r, \theta, z) = (r \cos \theta, r \sin \theta, z) : 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq \sqrt{5}, 0 \leq z \leq 1 + r^2\}.$$

$$\begin{aligned} \text{Assim, } \iiint_E e^z dV &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\sqrt{5}} \int_0^{1+r^2} e^z \cdot r dz dr d\theta = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \cdot \int_0^{\sqrt{5}} r \left[e^z \right]_{z=0}^{z=1+r^2} dr = \frac{\pi}{2} \cdot \int_0^{\sqrt{5}} r e^{1+r^2} - r dr \\ &= \frac{\pi}{2} \left[\frac{1}{2} e^{1+r^2} - \frac{r^2}{2} \right]_{r=0}^{r=\sqrt{5}} = \frac{\pi}{4} (e^6 - e - 5) \end{aligned}$$

9(b) A região R pode ser descrita pelas condições $0 \leq x-y \leq 2$ e $0 \leq x+y \leq 2$, pelo que $T([0,2] \times [0,2]) = R$.

$$\text{Temos } \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2$$

$$\text{pelo que } \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \frac{1}{2}.$$



$$\begin{aligned} \text{Assim, } \iint_R (x-y)^2 dA &= \int_0^2 \int_0^2 u^2 \cdot \frac{1}{2} du dv = \int_0^2 dv \int_0^2 \frac{u^2}{2} du = \\ &= 2 \cdot \left[\frac{u^3}{6} \right]_0^2 = \frac{8}{3}. \end{aligned}$$