FISICA (2009/2010)
Informática
Exame de Época Normal - 1ª Parte

1. Um projectil é lançado com velocidade inicial fazendo um ângulo entre 0° e 90° (inclusive) com a horizontal. Qual das afirmações seguintes é falsa?

- a) Pode existir um ponto da trajectória em que os vectores velocidade e aceleração são paralelos um ao outro.
- b) Pode existir um ponto da trajectória em que os vectores velocidade e aceleração são perpendiculares um ao outro.
- c) Existe um ponto da trajectória em que a componente vertical da velocidade é igual a zero.
- d) Existe um ponto da trajectória em que a aceleração é igual a zero.

- a) Verdadeira. Para isso acontecer, a velocidade teria de ser vertical. Como se admite ângulos de lançamento de 90° ...
- b) Verdadeira. No ponto mais alto da trajectória, quando o lançamento não é vertical.
- c) Verdadeira. No ponto mais alto da trajectória...
- d) Falsa. A aceleração é sempre constante e vertical, para baixo.

2. A aceleração dum corpo é dada por $\vec{a} = 6t\vec{i} \text{ m/s}^2$. O corpo parte da origem das coordenadas com velocidade inicial, $\vec{v}_0 = (3\vec{j})\text{m/s}$. Qual das seguintes equações indica correctamente o vector posicional do corpo em unidades de m?

a) $\vec{r}(t) = t^3\vec{i} + 3t\vec{j}$

b) $\vec{r}(t) = 6t\vec{i} + 3\vec{j}$

c) $\vec{r}(t) = 3t^2\vec{i} + 3t\vec{j}$

d) $\vec{r}(t) = (3 + 3t^2)\vec{i} + 3t\vec{j}$

$$\vec{a} = 6t\vec{i}$$

$$\vec{v} = \int \vec{a} dt + \vec{v}_0$$

$$= \int 6t dt \vec{i} + 3\vec{j}$$

$$= 6 \int t dt \vec{i} + 3\vec{j}$$

$$= 6 \times \frac{1}{2} \times t^2 \vec{i} + 3\vec{j}$$

$$= 3t^2 \vec{i} + 3\vec{j}$$

$$\vec{r} = \int \vec{v} dt + \vec{r}_0$$

$$= \int 3t^2 dt \vec{i} + \int 3 dt \vec{j} + 0\vec{i} + 0\vec{j}$$

$$= 3 \times \frac{1}{3} \times t^3 \vec{i} + 3t \vec{j}$$

$$= t^3 \vec{i} + 3t \vec{j}$$

verifique, derivando duas vezes...

3. Um tubo oco está dobrado de modo a formar três quarto circunferência horizontal. Uma bola é lançada através do tubo com velocidade de módulo elevado. Despreze o atrito e a resistência do ar. Quando a bola emerge da outra extremidade, segue a trajetória:
- a) A b) B c) C
d) Não tem dados suficientes para responder.

A bola sai com a velocidade que tem no final do tubo, que é tangente à trajetória: C

4. Um bloco de massa m desce com velocidade constante um plano inclinado que faz um ângulo θ com a horizontal. O coeficiente de atrito cinético entre o plano inclinado e o bloco é de:

a) $m g \sin \theta$

b) $m g \cos \theta$

c) $\tan \theta$

d) $1 - \cos \theta$

$$\begin{aligned} \text{força de atrito} &= \text{coeficiente de atrito} \times \text{força normal} \\ \text{coeficiente de atrito} &= \frac{\text{força de atrito}}{\text{força normal}} \\ &= \frac{\text{componente do peso na direção do plano}}{\text{componente do peso na direção perpendicular ao plano}} \\ &= \frac{AB}{AD} \\ &= \tan \theta \end{aligned}$$

5. Um esquiador desce as encostas 1, 2, 3 e 4 com inclinações diferentes. Em 1 e 2, o gelo está firme e ele desliza praticamente sem atrito. Em 3 e 4 o coeficiente de atrito cinético é de 0,1. Assinale qual das respostas indica correctamente a ordenação das encostas por ordem crecente do aumento da velocidade do esquiador.

- a) 3=4, 1=2
- b) 1=2=3=4
- c) 4, 3, 2, 1
- d) 3, 4, 1=2

havendo conservação de energia mecânica (não há atrito):

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2$$

$$v = \sqrt{2gh}$$

logo, "1" = "2"

nas partes "3" e "4" do percurso, a resultante das forças é:

$$mg \sin \theta - \mu mg \cos \theta$$

o trabalho da resultante é (sendo d o comprimento do percurso)

$$W = (mg \sin \theta - \mu mg \cos \theta) \times d$$

$$= (mg \sin \theta - \mu mg \cos \theta) \times \frac{h}{\sin \theta}$$

$$= mg \sin \theta \times \frac{h}{\sin \theta} - \mu mg \cos \theta \times \frac{h}{\sin \theta}$$

$$= mgh - \mu mgh \frac{1}{\tan \theta}$$

$$= mgh \left(1 - \frac{\mu}{\tan \theta} \right)$$

o trabalho da resultante é igual à variação da energia cinética.

Aumentando o ângulo (mantendo-se inferior a 90°), aumenta a tangente do ângulo e diminui a fracção $\mu/\tan \theta$

Logo, $(1 - \mu/\tan \theta)$ aumenta e, portanto, a variação de energia cinética aumenta também.

a sequência é, pois, "3", "4", "2"="1"

6. O gráfico da figura representa a variação da energia potencial $E_p(x)$, a que uma partícula está sujeita, com a variável x . A partícula está em equilíbrio estável no ponto:

- a) x_1
- b) x_2
- c) x_3
- d) x_4

É no ponto x_3 que a partícula está em equilíbrio estável: tem energia potencial mínima.

7. O corpo representado é formado por duas partes de igual volume, uma de madeira e outra de cobre (o cobre é mais denso que a madeira). O centro de massa deste corpo está:

- a) entre P_1 e P_2
- b) entre P_2 e P_3
- c) entre P_3 e P_4
- d) entre P_4 e P_5

Se os corpos tivessem igual densidade, o CM estaria em P_3 . Assim, como o cobre é mais denso, o CM está mais próximo de P_4 , entre P_3 e P_4 .

8. Uma roda, girando inicialmente a uma velocidade angular de 27 rad/s, abranda com uma aceleração angular dada por $3t^2$ rad/s². A velocidade angular em rad/s ao fim de 2 s é:

- a) 12
- b) 3
- c) 0
- d) 19

aceleração angular = $3t^2$ (rad/s) /s para o lado oposto à velocidade angular inicial

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt}$$

$$\omega = \int \alpha dt + \omega_0$$

$$= \int (-3t^2) dt + 27$$

$$= -3 \int t^2 dt + 27$$

$$= -3 \times \frac{1}{3} t^3 + 27$$

$$= -t^3 + 27$$

$$\text{velocidade angular ao fim de 2 s} = -2^3 + 27$$

$$= -8 + 27$$

$$= 19 \text{ rad/s}$$

9. No movimento oscilatório harmónico de um corpo com frequência angular dada por $\omega = \sqrt{3}$ rad/s, qual das relações seguintes indica correctamente a relação entre a aceleração do corpo e a sua posição?

a) $a = -3x$

b) $a = -\sqrt{3}x$

c) $a = +3x$

d) $a = +\sqrt{3}x$

$$F_x = -kx$$

$$a_x = \frac{-kx}{m}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\omega^2 m = k$$

$$a_x = \frac{-\omega^2 m x}{m}$$

$$= -\omega^2 x$$

$$\omega = \sqrt{3}$$

$$a_x = -(\sqrt{3})^2 x$$

$$= -3x$$

10. Duas estrelas têm na situação inicial energia cinética nula, energia potencial igual a U_i e estão a uma distância D uma da outra. Sob a acção da interacção gravitacional avançam uma para a outra. Escolha a resposta que indica correctamente a que distância estão quando a soma das suas energias cinéticas é igual a $|U_i|/2$.

a) $D/4$

b) $D/2$

c) $D/3$

d) $2D/3$

A força gravitacional entre as estrelas é inversamente proporcional ao quadrado da distância D .

Mas a energia potencial gravitacional é inversamente proporcional à distância D .

Assim, diminuindo a energia potencial para metade, a distância D diminui para metade.

Questão 1 (23) (Cotações: a) 2,0; b) 1,0; c) 1,0; d) 1,0)

Considere um bloco que desliza sobre um trilho com uma velocidade de $4,0 \text{ m.s}^{-1}$, desce uma distância h conforme ilustra a figura abaixo. O trilho não tem atrito, excepto na porção horizontal inferior onde o bloco desliza uma certa distância d até parar devido ao atrito. Considere a distância h igual a 45 cm e o coeficiente de atrito $0,15$ e $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$:

- Usando considerações relativas a conservação da energia mecânica, num só passo de raciocínio (isto é considerando como situação inicial a representada e como final o corpo parado após o percurso) determine d .
- Determine o valor da velocidade do corpo no início do percurso com atrito.
- Identifique as forças que actuam sobre o corpo no trajecto rectilíneo final e determine o valor da aceleração neste trajecto.
- Determine o tempo gasto no trajecto rectilíneo final.

a) $\text{energia mecânica no topo do trilho} = \text{energia mecânica no fim do trilho inclinado}$

energia mecânica no topo do trilho

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} m v^2 + m g h &= \frac{1}{2} m \times 4,0^2 + m \times 10 \times 0,45 \\ &= 8 m + 4,5 m \\ &= 12,5 m \end{aligned}$$

energia mecânica no fim do trilho inclinado ($m = \text{massa do corpo}$)

$$= 12,5 m$$

$\text{energia mecânica no fim do trilho inclinado} = \text{energia dissipada no trilho horizontal}$

energia dissipada no troço horizontal = - trabalho da força de atrito

$$\begin{aligned} 12,5 m &= -\text{força de atrito} \times d \times \cos 180^\circ \\ 12,5 m &= -\mu \times \text{força normal} \times d \times \cos 180^\circ \\ 12,5 m &= -0,15 \times m g \times d \times (-1) \\ 12,5 &= 0,15 \times 10 \times d \\ d &= \frac{12,5}{1,5} \\ &= 8,3 \text{ metros} \end{aligned}$$

b) $\frac{1}{2} m v_{\text{topo}}^2 + m g h = \frac{1}{2} m v^2 + 0$

$$\frac{1}{2} m 4,0^2 + m 10 \times 0,45 = \frac{1}{2} m v^2$$

$$\frac{1}{2} 4,0^2 + 10 \times 0,45 = \frac{1}{2} v^2$$

$$8 + 4,5 = \frac{1}{2} v^2$$

$$v = \sqrt{25}$$

$$= 5 \text{ m/s}$$

- c)
d)

para movimentos com aceleração constante, tem-se:

$$v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a_x(x - x_0)$$

$$0 = 5^2 + 2a_x \times 8,33$$

$$\begin{aligned} a_x &= -\frac{25}{16,666} \\ &= -1,5 \text{ (m/s)/s} \end{aligned}$$

para movimentos com aceleração constante, tem-se:

$$x = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2$$

$$\frac{12,5}{1,5} = 0 + 5t + \frac{1}{2}(-1,5)t^2$$

$$t = 3,33 \text{ s}$$

nota: referencial Ox horizontal, a apontar para a direita, origem no início do plano horizontal

Questão 2 (23) (Cotações: a) 2,0; b) 1,5; c) 0,75; d) 0,75)

Um corpo 1 com massa de 2,0 kg e outro corpo 2 com massa de 1,0 kg estão suspensos por uma roldana que tem de raio 16 cm e massa de 2,0 kg, como se mostra na figura. A corda tem massa negligível e faz rodar a roldana sem escorregar. A roldana roda sem atrito. Os corpos partem do repouso quando distam h um do outro. Considere a roldana como um disco uniforme ($I = MR^2/2$), $h = 6,4$ m e $g = 10\text{m/s}^2$.

- Determine a aceleração dos dois corpos.
- Determine a velocidade dos dois corpos quando passam um pelo outro e a energia cinética do sistema. [Repare que o deslocamento de cada corpo não será h]
- Quanto tempo passa desde o instante inicial até à situação referida em b).
- Qual o deslocamento angular da roldana nesse intervalo de tempo.

a)

análise global do problema...

sistema de equações:

$$\begin{cases} 20 - F_1 = 2.0 a \\ F_2 - 10 = 1.0 a \\ 0.16 F_1 - 0.16 F_2 = \frac{2.0 \times 0.16^2}{2} \alpha \\ a = \alpha \cdot 0.16 \end{cases}$$

solução do sistema de equações:

$$\begin{cases} F_1 = 15 \\ F_2 = 12.5 \\ a = 2.5 \\ \alpha = 15.6 \end{cases}$$

IMPORTANTE:

estas soluções fazem sentido!

corpo 1:

resultante das forças = $20 - 15$, para baixo!

corpo 2:

resultante das forças: $12.5 - 10 = 2.5$ para cima!

disco:

roda no sentido directo, porque F_1 é maior que F_2

- b)
- c)
- d)

adoptando um referencial Oy com origem na posição inicial do corpo 1 e apontando para cima:

equações de movimento para o corpo 1

$$y = \frac{1}{2}(-2.5)t^2$$

$$v_y = -2.5 t$$

equações de movimento para o corpo 2

$$y = -6.4 + \frac{1}{2}2.5 t^2$$

$$v_y = -2.5 \times 1.6 = -4.0 \text{ m/s}$$

$$v_y = 2.5 t$$

quando passam um pelo outro, estão na mesma coordenada y :

$$\frac{1}{2}(-2.5)t^2 = -6.4 + \frac{1}{2}2.5 t^2$$

resolvendo, obtém-se a seguinte solução positiva: $t = 1.6 \text{ s}$

passam um pelo outro ao fim de $t = 1.6 \text{ s}$

velocidade ao fim de $t = 1.6 \text{ s}$

para o corpo 1

$$v_y = -2.5 \times 1.6 = -4.0 \text{ m/s}$$

para o corpo 2

$$v_y = 2.5 t = 4.0 \text{ m/s}$$

IMPORTANTE: estas soluções fazem sentido! A aceleração dos dois corpos é igual...

deslocamento angular ao fim de $t = 1.6 \text{ s}$

$$\theta = \frac{1}{2}15.6 t^2$$

$$= \frac{1}{2}15.6 \times (1.6)^2$$

$$= 20.0 \text{ rad}$$